



Document 'Reanimatie-SIT cie: Richtlijnen Specialistische reani...

ONBEHEERDE KOPIE printdatum Huidige datum: 25-04-2026 Huidige tijd: 09:22

Advanced Life Support in het Maasstad Ziekenhuis

- Als bij aankomst de AED aangesloten is op de patiënt, schakel de pads om naar de defibrillator. Als er nog niks aangesloten is dan de pads van de defibrillator plakken, terwijl de BLS plaatsvindt.
- Maak een nieuwe rolverdeling met aangekomen team. Verdeel de taken onder elkaar na de ritmecheck afwisselt.
- Laad op terwijl de thoraxcompressies worden voortgezet.
- Continueer de thoraxcompressies terwijl beademingen gestaakt worden. Bij toediening bij masker-ballon beademing op afstand. Als de defibrillator ook de thoraxcompressies, wordt het ritme gecontroleerd en gelijktijdig.
- De totale onderbreking van thoraxcompressies door de ritmecheck maximaal 10 seconden duren.
- Hervat na de ritmecheck, met eventuele schok, onmiddellijk de thoraxcompressies. De hulpverlener gewisseld is.
- Herhaal de ritmecheck elke 2 minuten. Blijf gedurende de reanimatie massage controleren en coachen.
- Denk aan het aansluiten van capnografie bij de masker-ballon.
- Wanneer de luchtweg gezekerd is dmv een tube/ larynxmasker kunnen de thoraxcompressies worden gegeven zonder beademingspauze waarbij de

ANNULEREN

toegang niet haalbaar is

- Doorloop 4H's en 4T's als BLS loopt.
- Indien reanimatie niet succesvol ondanks adequate ALS: Denk aan Extra Corpore Support, neem contact op met ECMO centrum.

Bijzondere omstandigheden